

石狩管内で「牛のサルモネラ症」続発！！

10月2日、管内で2年ぶりにサルモネラ・ティフィムリウムによる牛のサルモネラ症が発生、続発も確認されています。

サルモネラ症の予防対策を徹底しましょう！

★サルモネラ症の特徴

- ・サルモネラ菌による牛やヒトなどの食中毒です。
- ・感染牛は糞便中に大量のサルモネラ菌を排泄します。
- ・サルモネラ菌は汚れた飼槽・水槽などで増殖し、**経口**感染します。

★対策のポイント

飼養衛生管理基準
の再確認を！！

農場・牛舎への侵入防止対策

- ・農場出入り口での**車両消毒**を徹底しましょう。
- ・牛舎ごとに**長靴交換**または**踏込消毒槽**を設置しましょう。
- ・**導入牛**は一定期間**隔離**し健康観察しましょう。
- ・**防鳥ネット**等で野生動物や野鳥の侵入を防止しましょう。

牛の感染防止対策

- ・**飼槽・水槽**などの**洗浄、消毒**を徹底しましょう。
- ・十分な**初乳の給与**で子牛の免疫を強化しましょう。

発症牛の早期発見、隔離、治療

- ・**発熱、下痢、血便、乳量激減、呼吸器症状、流産**などがみられたらすぐに隔離し、獣医師に連絡してください。

↓本病に関する問い合わせ等はこちら↓